

MÉDECIN

PHARMACIEN(NE)

INFIRMIER(ÈRE)

PATIENT(E)

Iatrogénie : comment éviter les complications liées aux médicaments ?



Erreurs de **PRESCRIPTION**

L'informatisation de la prescription réduit ce risque.

Erreurs de **TRANSCRIPTION**

La lecture du code-barres au lit du malade réduit ce risque.



Erreurs de **DISPENSATION**

La lecture du code-barres en pharmacie réduit ce risque.



Enregistrement de l'administration



Erreurs d' **ADMINISTRATION**

La lecture du code-barres au lit du malade réduit ce risque.



La iatrogénie médicamenteuse désigne les effets indésirables que l'on peut imputer aux médicaments et/ou les interactions médicamenteuses ayant des conséquences sur la santé d'une personne. La lutte contre la iatrogénie passe par le développement d'une véritable culture du bon usage du médicament au sein de l'ensemble de la chaîne pharmaceutique et des professionnels du soin, mais aussi de la population.



20%

Part des hospitalisations de patients de plus de 80 ans dues à la iatrogénie médicamenteuse.¹

45%

Pourcentage des cas dans lesquels les complications liées aux médicaments seraient évitables

4

Nombre de médicaments consommés quotidiennement, en moyenne, par les 75-84 ans.

Source : Leem

¹) <https://reflexeiatrogenie.com>